外臺祕要方卷第九 欬嗽二十三門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

欬嗽方三首

五嗽方四首

新久嗽方三首

卒欬嗽方八首

暴熱嗽方二首

冷欬方三首

欬失聲方四首

氣嗽方八首

呷欬方二首

熏欬法六首

療欬方一十四首

積年久欬方二十一首
久欬坐臥不得方二首
欬嗽短氣方七首
九種欬方一首
欬逆及厥逆飲欬方七首
十欬方七首
久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首
欬嗽膿血方一十一首
久欬嗽膿血方四首
欬嗽唾粘方二首
許仁則療欬方一十二首
雜療欬嗽方三首

欬嗽方三首

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑爲表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六腑皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音聲甚則唾血乘夏則心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則兩（一作左）脅下痛甚則不可轉側兩胠下滿乘季夏則脾先受之脾欬之狀欬則右脅下痛陰引於肩背甚則不可以動動則欬乘冬則腎先受之腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬逆此五藏之欬也五藏欬久不已傳與六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺糞心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣失氣者

與欬俱出腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺溺久欬
不已則三膲受之三膲欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於
胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種欬一曰風
欬欲語因欬言不得終是也二曰寒欬飲冷食寒注入於胃從
肺脉上氣内外合因之而欬是也三曰支欬心下硬滿欬則引
四肢痛其脉反遲是也四曰肝欬欬而引脇下痛是也五曰心
欬欬而唾血引手少陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下
引少腹是也七曰肺欬欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬欬
則耳聾無所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口苦
是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以前
脉手陽明經也其脉浮則爲陽實陽實者病苦腹滿善喘欬
脉微大爲肝痺欬引少腹欬嗽脉浮大者生沈小伏匿者死又
云脉浮直者生沈硬者死欬且嘔腹脹且泄其脉弦弦欲絶者
死欬脫形發熱脉小硬急者死欬且羸瘦絡脉大硬者死欬而
尿血羸瘦脉大者死出第十四卷中

小品療欬嗽紫菀七味湯方

紫菀半兩 五味子一兩 桂心二兩 杏人七十枚去皮尖兩人碎
乾薑四兩 麻黃四兩去節 甘草二兩炙

右藥切以水九升煎取二升半去滓温服七合日三服經
心録古今録驗同忌海藻菘菜生葱蒜麪腥膩出第二
卷中

延年紫菀飲主欬嗽方

紫菀 貝母 茯苓 杏人去皮尖兩人者
生薑各三兩 人參二兩 橘皮一兩去脉

右七物切以水五升煑取一升五合去滓分温三服如人行
七八里更進一服忌葱蒜麪酢張文仲處古今録驗同出第

五巻中

古今録驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬六兩去心　杏人三升去雙人皮尖碎　椒三升熬令汗出　桂心

厚朴炙　杜仲　苦參各三兩　附子六兩炮

乾薑六兩　烏頭二枚炮　人參六兩　蜈蚣一枚去頭足炙

右十二味別擣杏人其餘者合擣下篩以五斤膠飴和擣千杵服如大棗一枚日三忌冷水猪肉生葱鯉魚出第九巻中

五嗽方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鱢嗽四曰冷嗽五曰邪嗽四滿丸方

乾薑　桂心　躑躅花　芎藭

紫菀　芫花根皮各二分　人參　細辛

甘草炙　半夏洗　鬼督郵各一分　蜈蚣一枚去頭足炙

右十二物擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方祕不傳忌羊肉餳生葱生菜海藻菘菜

又方

特生礜石一兩泥包燒半日　款冬花一兩　豉三百枚擣千杵

巴豆十六枚去心皮熬別擣如脂

右四味擣篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增至四五丸忌野猪肉蘆笋並出第十八巻中古今録驗療三十年欬

備急華佗五嗽丸方

皂莢炙　乾薑　桂心

右三物等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三忌葱出第三巻中

古今録驗四滿丸療五嗽一爲氣嗽二爲痺嗽三爲膲嗽四爲

邪嗽五爲冷嗽悉療之方

蜈蚣二枚炙 芫花根五分熬 躑躅花四分 乾薑

芎藭 桂心各四分 人參 細辛各二分

右八味擣篩蜜和爲丸一服米飲下五丸如大豆許日三稍加至十丸忌生葱生菜出第十九卷中

新久欬方三首

深師療新久欬嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黄湯方

麻黄四兩去節一方二兩 桂心二兩 甘草二兩 大棗十四枚擘

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有効忌海藻菘菜生葱等物

又療新久欬嗽前胡丸方

前胡六分 烏頭二枚炮 桔梗 乾薑各二分

桂心八分 蜀椒八分汗

右六味擣篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之汁日三又療久欬晝夜不得卧咽中水雞聲欲死者療之良忌猪肉冷水生葱並出第十八卷中

千金療新久欬嗽欵冬花煎方

欵冬花 乾薑爲末 芫花根熬爲末各二兩

五味子 紫菀各三兩

右五味先以水一斗煮三物取三升半去滓內芫花乾薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如飴可一升半服棗核大含之日三服曾數用甚良忌蒜麪腥膩深師同出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

釜月下土一分 豉七分熬

右二物熬擣蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有驗

又方

飴糖六分 乾薑六分末 豉二兩

右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓内飴糖消後内乾薑末分爲三服

又方

生薑汁 百部根汁

右二物合煎服二合並出第一卷中

張文仲卒欬方

百部根四兩

右一物酒一斗煮之再宿火温服一升日再服之効肘後同

又方

温清酒一升 驢膏一升

右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒欬嗽方

芫花二兩熬

右一物水二升煮四沸去滓内白糖一斤服如棗大勿食鹹酸物亦療久欬肘後同

又方

爐中取鈆屑一分 桂心二兩 皂莢二兩去皮子炙

右三物擣篩蜜和丸如梧子許大人米飲下服十五丸小兒五丸日二服忌生葱肘後同並出第三卷中

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絶麻黄湯方

麻黄去節 細辛各二兩 甘草半兩炙 桃人二十枚去皮尖兩人者研

右四味切以水七升煮取三升去滓分三服祕方忌海藻菘菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏人飲方

杏人（四十枚去皮尖兩人研） 柴胡（四兩） 紫蘇子（一升） 橘皮（一兩）

右四味切水一斗煑取三升分三服常服飲之不妨出第十八卷中（本方無紫蘇子有乾棗）

延年貝母煎主暴熱欬方

貝母（三兩） 紫菀 五味子 百部根

杏人（去皮尖兩人者研） 甘草（炙各二兩）

右六味切以水五升煑取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好蘇二合生薑汁一合又先取地黃麥門冬及湯汁和煎減半內蘇薑汁攪不得停手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚥之日三夜再蔣孝璋處忌海藻菘菜鹹物出第五卷中

冷欬方三首

深師療冷欬逆氣乾薑湯方

乾薑（四兩） 紫菀（一兩） 杏人（七十枚去皮尖雙人切） 麻黃（四兩去節）

桂心 甘草（炙各二兩） 五味子（一兩）

右七味切水八升煑取二升七合分三服平體人加射干（一兩）代乾薑忌海藻菘菜生葱等

又療冷飲欬芫花煎方

芫花（二兩） 乾薑（二兩） 白蜜（二升）

右三味擣篩二味內蜜中攪令相和微火煎令如糜服如棗核一枚日三夜一欲痢者多服並出第十八卷中（千金主新久欬）

千金療冷嗽方

乾薑（三兩末） 膠飴（一斤）

右二味攪令和調蒸五升米下令熟以棗大含化稍稍嚥之

日五夜三出第十八卷中

欬失聲方四首

廣濟療咽喉乾燥欬嗽語無聲音桂心散方

桂心三兩　杏人三兩去皮尖雙人熬擣

右二味擣篩爲散以蜜和綿裹如棗大含之嚥汁日三夜二忌生葱油膩出第二卷中

古今録驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中瘂塞失音聲者方

取芫花根一虎口切暴

右一味令病人以薦自縈就裏舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆罷剌郎達切畢畢耳勿住令芫花根盡則止病必於此差

又療忽暴欬失聲語不出杏人煎方

杏人一升去皮尖兩人者熬　通草四兩　紫菀　五味子各三兩

貝母四兩　桑白皮五兩　蜜一升　清糖一升

生薑汁一升

右九味切以水九升煮五味取三升去滓内杏人脂薑汁蜜糖和攪微火上煎取四升初服三合日再夜一稍稍加之千金同忌蒜麪豕肉等

又通聲膏方

五味子　款冬花　通草各三兩　杏人一升去尖皮兩人者熬

人參　桂心　細辛　青竹皮

菖蒲　酪酥各二兩　棗膏三升　白蜜一升

薑汁一升

右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓内薑汁棗膏煎令調和酒服如棗二枚忌生菜生葱羊肉餳並出第十九卷中千金用蘇五升棗膏蜜各二升餘同

氣嗽方八首

病源夫肺主氣候皮毛人有運動勞役其氣外泄腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故爲暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫出第十四卷中

古今錄驗療患氣嗽并下焦冷結方後四方同療姚大夫別錄要方

紫菀　貝母　百部根　款冬花

五味子　半夏洗各五分　射干十分　芫花根皮四分切熬令焦

乾薑　橘皮各四分　杏人八分去皮尖雙人者熬　蘇子四分

白石英八分研　鐘乳十分研

右十四味擣篩以蜜和爲丸如梧桐子酒服十丸日再稍加至三十丸忌羊肉餳諸生冷等物

又方

乾地黃　桂心　山茱萸　五味子各三兩

茯苓四兩　蓯蓉　丹參　澤瀉

甘草炙　鐘乳研各二兩

右十味擣篩蜜和酒服十五丸如梧子日增至三十丸忌海藻生葱醋物菘菜蕪荑

又酒方

丹參　乾地黃各五兩　芎藭　石斛

牛膝　黃耆　白朮　蓯蓉各四兩

防風　獨活　附子炮　秦艽

桂心　乾薑各三兩　鍾乳六分研

右十五味切以酒三斗浸七日初服二合日再稍稍加之忌食桃李雀肉生葱猪肉冷水蕪荑

又丸方

乾地黃四兩　防風　蓯蓉　澤瀉各三兩

山茱萸　丹參　五味子　茯神各二兩一方作茯苓

桂心一兩半

右九味擣篩蜜和丸如梧子酒服二十丸日再稍加至三十丸忌醋物生葱蕪荑並出第十九卷中

延年杏人煎主氣嗽方

好杏人一升去皮尖兩人者酥熬　糖一合　蜜五合　酥一合

生薑汁一合　貝母八合別篩末　蘇子汁一升以七合蘇子研水和濾取汁

右七味先擣杏人如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之忌猪肉蔣孝瑜處

又療氣嗽煎方

貝母　紫菀　百部根炙　款冬花

甘草炙各三兩　桂心二兩

右六味切以水六升煮取一升五合去滓內後

生地黃汁三升　生麥門冬汁五合　生薑汁五合　白蜜五合

酥五合　白糖五合　杏人三合去皮尖雙人熬擣作膏

煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忌海藻生葱菘菜蕪荑蒜醋鹹食猪肉等

又療氣嗽杏人煎方

杏人五合去皮尖擣研　生薑汁二合　酥一合　蜜三合

右四味以水三升研杏人取汁內銅鐺中煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三服夜一服稍加至兩匙忌猪肉

又杏人煎主氣嗽方

杏人一升去尖皮兩人者研濾取汁　酥三合　白蜜三合

右三味以水三升研濾杏人令味盡內銅鐺中煎可減半內酥蜜煎二十沸內貝母末四分紫菀末三分甘草炙末一

分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以欬嗽止爲度大驗忌蒜猪肉並出第五卷中

呷欬方二首

病源呷欬者猶是欬嗽也其胷膈淡飲多者欬則氣動於淡上搏咽喉之間淡氣相擊隨欬動息呀呷有聲謂之呷欬其與欬嗽大體雖同至於投藥則應加消淡破飲之物以此爲異耳出第十四卷中

崔氏三十年以來呷欬並療之方

莨菪子新者　南青木香眞者　熏黃無石臭者

右三味等分擣篩爲散以羊脂塗青紙一張以散藥著紙上卷裹之平旦空腹燒裹頭令煙出吸取十嚥日中時復吸十嚥日晚後吸十嚥七日內禁生冷醋滑三日則差出第六卷中

古今録驗療呷欬書墨丸方大神驗萬年縣令席君懿送

書墨二分　甘遂二分　葶藶子二分熬　前胡五分

大黃五分　巴豆二分去心皮熬

右六味擣篩爲散巴豆葶藶別細研蜜和丸如梧子以白蜜粥清飲旦空腹服三丸人弱服二丸則利水或吐三日以後更一服還如上法不過三服愈療三十年欬如利不止者以冷白飲止之吐利止後食禁生冷醋滑猪魚雞麪油酒冷水蒜蘆笋此藥宜春夏服之有毒之藥寧從少起出第十九卷中廣濟療瘕嗽上氣喉中作水雞鳴

熏欬法六首

千金療欬熏法

細熟艾薄薄布紙上廣四寸復以石硫黃末薄布艾上務令調勻以荻一枝如紙長卷之作十枚先以火燒纏下去荻其

煙從荻孔中出口吸取煙嚥之取吐止明旦復熏之昨日餘

者後日復熏之三日止自然差惟得食白糜餘皆禁之古

今録驗同

又法

重黃一兩研令細

以蠟蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻卷之如前法裹之亦

如上法日一二止以吐爲度七日將息後羊肉羹補之

又法

爛青布廣四寸上布艾艾上又布青礬礬石末礬上布少熏黃

末又布少鹽又布少豉末急卷之燒令著內燥罐中以紙蒙

頭作小孔以口含取煙嚥之以吐爲度悶時復息煙盡止日

一二用三卷用不盡差三七日愼油膩並出第十八卷中

崔氏療久欬不差熏法

款冬花

右一味每旦取如雞子許用少許蜜拌花使潤內一升鐵鐺

中又用一瓷椀合鐺椀底鑚一孔孔內挿一小竹筒無竹葦

亦得其筒稍長作椀鐺相合及挿筒處皆麪埿之勿令漏

煙氣鐺下著炭火少時款冬煙自從筒中出則口含筒吸取

煙嚥之如覺心中少悶須暫舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏

煙氣吸煙使盡止凡如是三日一度爲之待至六日則飽食

羊肉餺飥一頓則永差出第六卷中

古今録驗療欬欱呼合切下同煙法

鍾乳研　白石英研　人參　丹參研

雄黃各七分研　水銀二分研　烏羊腎脂一具　淨紙十張

右八味各擣篩爲末以水銀投藥裹細研使入諸藥羊脂熬

取置紙中令均平使厚一分散藥令周遍翦紙一張作三分

瘦弱婦人五日用半寸熏未服藥前齊五日服藥後一百日
忌五辛酒肉此一劑得療五十人上氣悉皆愈忌生血物

又療欬腹脹氣上不得卧身體水腫長孫振熏法

蠟紙一張熟艾薄布遍紙上

熏黃末一分 款冬花末二分

右三味並遍布艾上著一葦筒卷之寸別以繩繫之燒下頭
欲煙嚥之亦可三十嚥飲訖則差欲盡三劑一百日斷鹽醋
日一每欲三寸三日盡一劑出第十九卷中

療欬方一十四首

深師療欬方

巴豆炮去殼勿傷肉

右完吞初日飲服二枚日三服良忌野猪肉蘆笋千金同

又方

蜀椒一合汗去目 杏人去皮熬倍少於椒 豉少多與杏人相似熬 款冬花如豉一半多

右四味擣蜜和爲丸晚間不食含一丸如彈丸大含一丸則
知効驗十年者五六日知良並出第十八卷中

小品療欬生薑五味子湯方

五味子五合 生薑八兩 紫菀一兩 半夏二兩洗

吴茱萸一兩 款冬花半兩 細辛一兩 附子一枚炮

茯苓四兩 甘草二兩炙 桂心一兩

右十一味切以水一斗煑取五升分温三服老人可服五合忌
海藻菘菜猪肉冷水羊肉餳生菜醋物生葱古今録驗同出
第一卷中

備急療欬方

杏人半斤去尖皮兩人者熬 紫菀二兩

右二味先研杏人取汁使盡細切紫菀更煎少濃去滓内蜜

使稠細細飲之立定出第三卷中

崔氏療欬方

杏人一升去尖皮兩人熬　蘇子汁五合　生薑汁五合煎　蜜五合煎令沫盡

右四味先擣杏人作脂訖内諸藥和煎攪調三四沸藥成含嚥如棗大日三四忌蒜麪出第六卷中

延年紫菀飲主欬方

紫菀一兩半　貝母二兩　杏人一兩半去皮尖兩人者研　人參一兩

橘皮一兩半　生薑一兩

右六味切以水二升五合煑取八合分三服欲再服亦得愼鹹醋蒜麪蔣孝璋處出第五卷中

必效療欬方

棗一百二十顆去核　豉一百粒　桃人一百二十顆去皮尖兩人者熬令色黄

右三味合擣爲丸如棗大含之無不差

又方

雞子白皮十四枚熬令黄　麻黄三兩去節

右二味擣成散每服方寸匕日二食後飲下之無所忌

又方

麻黄二兩去節　紫菀二兩　貝母三兩去心

右三味擣篩蜜和丸如杏核綿裹含稍稍嚥汁盡更作日四五度

又方

杏人一百二十枚去皮尖熬　豉一百枚熬令乾　乾棗四十枚去核

右三味合擣如泥丸如杏核含嚥令盡日七八度盡更作出第一卷中

古今錄驗百部湯療欬晝夜不得眠兩眼突出方

百部半兩　生薑半斤　細辛三兩　貝母三兩

甘草二兩炙　杏人四兩去皮尖兩人者　紫菀三兩　桂心二兩

白朮二兩　麻黃六兩去節　五味子二兩

右十一味切以水一斗二升煑取三升分三服忌桃李雀肉

海藻菘菜生葱千金無杏人紫菀餘同

又療欬噏散方

細辛　紫菀　天雄炮　石膏

款冬花　鍾乳各二分

右六味擣篩作散如大豆七聚以小竹筒噏服日二不得食生魚醬醋生菜但食糜七日欬愈乃止若大豆聚不知亦小益勿太多甚良忌生菜冷水猪肉千金同

又療欬麻黃五味子湯方

麻黃四兩去節　五味子五合　甘草二兩炙　半夏三兩洗

乾薑五合　細辛二兩　桂心六兩　杏人三兩去皮尖兩人者

右八味切以水一斗煑取四升去滓分温五服日三夜二忌海藻菘菜羊肉餳生菜生葱

又療欬羊肺湯太醫史脫方

款冬花一兩　紫菀　乾薑　細辛各一兩

桂心　甘草炙各半兩　五味子半升　白前

食茱萸各半兩　羊肺一枚細切

右十味切以水八升合煑取三升去滓一服三合日三禁食鹽蒜生菜海藻菘菜生葱並出第十九卷中

積年久欬方二十一首

病源肺感於寒微者則成欬嗽久欬嗽是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有欬嗽不已則各傳其腑諸久欬不已三焦受之其狀欬而腹滿不欲食飲此皆寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而變面浮腫氣逆故也出第十四卷中

時明

深師療五藏欬積年劇則上氣不得卧喉中如有物醫所不療

五愈丸方

桂心　細辛　乾薑　白菀

甘草（炙各三分）　蜀椒（汗）　代赭　通草

款冬花　芫花（熬各一分）　伏龍肝　紫菀

牡蠣（各二分熬）

右十三味擣篩以飴糖和之擣令調和如棗核一丸含之稍稍嚥其汁盡復含令胷中熱爲候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲欬者一月愈十歲欬者百日愈忌海藻菘菜生葱生菜等

又療三十年欬芫花煎方

芫花（二兩）　乾薑（三兩末之）

右二味以水五升煑芫花取三升去滓内薑末加蜜二升合煎之如糜一服如半棗日三不知加之一方不用乾薑取芫花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸日三

又療三十年欬氣奔上守死醫所不療海藻丸褚仲堪方

海藻（三分）　麥門冬（五分去心）　昆布　乾薑

細辛　文蛤　桂心　蜀椒（汗各二分）

右八味擣篩蜜和服如杏人許夜卧一丸著舌上稍稍嚥汁盡更著一丸忌生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四肢煩疼食飽則劇時有發甚不能行步夜不得卧多夢香豉丸

香豉（四分熬）　杏人（二分去尖皮兩人熬）　紫菀（三分）　桂心（三分）

甘草（八分炙）　乾薑（二分）　細辛（三分）　吴茱萸（二分）

右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚼嚥汁亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽款冬花丸方

款冬花六分 桂心四分 紫菀六分 杏人四分去尖皮兩人熬

附子二兩炮 藜蘆四分 乾薑六分 甘草七分炙

細辛六分 防風八分 芫花六分熬 蜀椒八分汗

野葛四分去心

右十三味擣篩蜜和丸如梧子服三丸稍加日三服忌生葱辛鹹醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味此方忌酢恐有茯苓

又療三十年欬逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血師藥不能療者方

香豉三升熬 蜀椒一升汗 乾薑一斤 猪肪三分

右四味擣篩内肪藥中以水五升合豉等物熟煎每以二合服之大效

又療三十年欬嗽七星散方

蜀椒汗 桑根白皮 芫花根皮 款冬花

紫菀 代赭 細辛 伏龍肝各一兩

右八物擣爲散取作七星聚聚如藊豆大以竹筒口當藥上一噏嚥之令藥入腹中先食訖即服藥日三服後三日不差復作七聚以一臠肉炙令熟以轉展藥聚上令藥悉在炙肉中仰卧㕮咀炙肉汁令藥力歆歆皆毒螫咽中藥力盡吞肉前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法必愈乃止羊牛鹿肉皆可用勿用猪肉忌生菜並出第十八卷中千金延年不用椒與芫花根餘同

千金療三十年欬嗽方

蜜一斤 生薑二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖内蜜復秤知斤兩次内薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日

三禁一切雜食

又療三十年欬方

紫菀二兩 款冬花三兩

右二味爲散先食飲服一錢匕日三七日愈張文仲古今録驗深師同

又療三十年欬方

百部根二十斤

右一味擣取汁煎之如飴以温粥飲服方寸匕日三服深師方白蜜二升更煎五六沸服三合有驗

又療久欬不差方

兎矢四十九枚 胡桐律一分 硇砂三分

右三味擣篩蜜和爲丸服如梧子三丸令吐冷物盡則差並出第十八卷中

延年療久欬不差方

豬腎一具去脂膜 椒二十八顆開口者

右二味取腎一顆上作十四孔取椒内孔中兩腎揔著二十八顆了以水緩煮令熟割破細切噉之令盡有驗張文仲處出第五卷中

崔氏療積年欬喉中啞聲方

芫花根白皮六分切熬令焦黑 貝母十二分 款冬花六分

百部根八分切熬 杏人十分去尖皮熬 皂莢四分去皮子炙 五味子六分

蜈蚣半枚炙 桑白皮六分 麻黃八分去節 紫菀八分

右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子一服五丸日再服加至十五丸煮棗汁送之出第六卷中

必効療欬嗽積年不差者胷膈乾痛不利方

紫菀一大兩 杏人四十九枚去兩人尖皮熬 酥一大合 蜜一大合

右四味紫菀及杏人各别擣先煑酥蜜攪令和内紫菀杏人研破塊煎十餘沸藥成出瓷器中毎日空腹服一彈丸細細含嚥之忌酒麪及猪肉等凌空道士得此方傳効不復可言

又方

莨菪二分以水淘去浮者水煑令牙出焙乾炒令黄黑色　酥一雞子許　大棗七枚

右三味鐺中煎令酥盡取棗去皮食之日二

又方

生薑五兩　餳半大升

右二味取薑刮去皮如筭子切之置餳中微火煎薑使熟食使盡則差叚侍御用之極効

又方

款冬花

右一味和蜜火燒含取煙嚥之三數度則差

又方

取莨菪子三指撮呑唾嚥之日五六度光禄李丞自服之極神効並出第一卷中

古今錄驗療人三十年寒冷欬逆上氣麻黄湯方

麻黄八分去節　蜀椒四分汗　細辛三分　藁本二分

杏人五十枚去皮尖兩人者碎

右五味切以水七升煑取三升分爲三服日三忌生菜

又許明療人久欬欲死方

取厚榆皮削如指大去黒刓令如鋸長尺餘内喉中頻出入當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年欬氣久寒冷痺脾中客熱變爲冷方

食茱萸一兩　甘草一兩　香豉二十枚　細辛

杏人去尖皮兩人者熬各一兩　紫菀二兩

右六味擣篩爲末別擣杏人如膏乃內末攪令匀蜜和丸如梧子服三丸日三不知增之至五丸暮卧時含十丸著咽喉中嚥之忌海藻菘菜生菜出第十九卷中

久欬坐卧不得方二首

集驗療久患氣嗽發時奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣欲絶方

麻黄去節　杏人去尖皮兩人者碎　紫菀各三兩　柴胡　橘皮各四兩

右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不差頻兩三劑從來用甚驗張文仲同出第四卷中

備急療久欬奔喘坐卧不得并喉裏呀聲氣絶方

麻黄去節　乾蘇葉　橘皮各三兩　杏人四兩去尖皮兩人者碎　柴胡四兩

右五味切以水六升煮取二升半分三服服兩劑必差甚効

張文仲同出第三卷中

欬嗽短氣方七首

病源肺主於氣候於皮毛氣虚爲微寒客於皮毛傷於肺氣不足則成欬嗽夫氣得温則宣和得寒則痞澀虚則氣不足而爲寒所迫併聚於肺間不得宣發故令欬而短氣也出十四卷中

深師療傷中欬嗽短氣腸中痛流飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五内不調肉蓯蓉湯方

肉蓯蓉五兩　乾地黄四兩　大棗三十枚擘　烏頭一兩炮

甘草炙　桂心　紫菀　五味子各二兩

生薑　石膏碎綿裹　麥門冬去心各三兩

右十一味切以水一斗五升煮取七升去滓分爲七服日四夜三一方用大棗五十枚水一斗二升煮取九升忌海藻生葱菘菜蕪荑猪肉冷水

又療上氣咽喉窒塞短氣不得卧倚壁而息腰背苦痛支脅滿不能食面色痿黃貝母飲方

貝母 石膏綿裹碎 桂心 麻黃去節

甘草炙各二兩 杏人三十枚去尖皮兩人者 生薑五兩 半夏五兩洗

右八味切以水一斗煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉生葱餳等

又療欬而下利胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒海藻湯方

海藻四兩 茯苓六兩 半夏五合洗 五味子五合

細辛二兩 杏人五十枚去尖皮兩人者

右六味切以水一斗煑取二升分三服忌羊肉餳生葱醋物千金同出第十八卷中一方有生薑一兩

古今錄驗五味子湯療逆氣欬嗽胷膈中寒熱短氣不足方

五味子一兩 前胡三兩 紫菀 甘草炙

桂心 生薑各二兩 棗三十枚擘 山茱萸三兩

右八味切以水一斗煑取七升絞去滓服一升日三夜三忌生葱海藻菘菜廣濟方用橘皮不用茱萸

又胡椒理中丸療欬嗽逆氣不能飲食短氣方

胡椒 畢撥 乾薑 款冬花

甘草炙 橘皮 高良薑 細辛各四兩

白术五兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀肉生菜海藻菘菜

又瀉肺湯療欬逆短氣方

人參三分 生薑四分 半夏五分洗 甘草四分炙

橘皮十二分 竹葉二兩

右六味切以水六升煮取二升分三服此方亦療霍亂忌羊肉餳海藻菘菜

又療欬嗽及短氣脅痛薑椒湯方

生薑　椒去目汗各一兩

右二味切以水五升煮取三升每服一合並出第十九卷中

九種欬嗽方一首

千金九種氣欬嗽欲死百病方

乾薑二分　半夏洗　細辛　紫菀

吳茱萸　芫花　茯苓　甘遂

防葵　甘草炙　人參　烏頭炮

大黃　葶藶子熬　巴豆去皮心熬　厚朴炙

杏人去皮尖兩人者熬各一分　五味子　遠志去心　枳實炙

皂角去皮子炙　當歸　桂心　前胡

昌蒲　大戟　蜀椒各半分　白薇三分

右二十八味擣合蜜丸先食服如梧子二丸日三以知爲度不知增之忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物野豬肉蘆笋出第十八卷中一方無巴豆有䗪蟲半分恐非

欬逆及厥逆飲欬方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣爲陽流行腑藏宣發腠理而氣肺之所主也欬病由肺虛感微寒所成搏寒於氣氣不得宣胃逆聚還肺肺則脹滿氣逆不下故爲欬逆其狀欬而胷滿氣逆髆背痛汗出尻陰股膝踹骭足皆痛也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云先以鼻内氣乃閉口欬還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復爲之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑又云還邐向

反望側望不息七通治欬逆胷中病寒熱出第十四卷中

深師療欬嗽短氣不得息發熱胷苦滿不得飲食五味子湯方

五味子二兩 桂心 甘草炙 細辛各一兩

乾薑三兩 紫菀二兩一方一兩 大棗二十枚擘 麻黄二兩去節

右八味切以水八升煑取三升分三服無乾薑生薑亦得忌海藻菘菜生菜生葱出第十八卷中

千金竹皮湯主欬逆下血不息方

生竹皮三兩 紫菀二兩 飴糖一斤 生地黄汁一升

右四味切以水六升煑取三升分三服忌蕪荑深師同

又大逆上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方

麥門冬二升去心 半夏一升洗 人參 甘草各二兩炙

粳米三合 大棗十四枚

右六味切以水一斗二升煑取六升服半升日三夜一忌羊肉餳海藻菘菜並出第十八卷中此本仲景傷寒論方

古今録驗療厥逆藏氣有餘寒氣虚勞憂氣驚氣其人善悸胷中或寒上下無常多悲傷流四肢臍四邊常有核遊腫大便不利遊氣湯方

厚朴四兩炙 人參 甘草炙 牡蠣各二兩熬

茯苓四兩 桂心 半夏各一兩洗 梔子四枚

生薑八兩 黄芩三兩

右十味切以水九升煑取三升半去滓分服七合日三夜再若腹痛去黄芩加芍藥三兩良驗忌海藻菘菜生葱羊肉餳醋物等

又療欬逆上氣丸方

乾薑四兩 桂心 款冬花各一兩 附子四箇炮

五味子二兩 巴豆六十枚老者三十枚去皮心熬

右六味先擣上五味下篩别擣巴豆如膏内藥末以蜜和丸如麻子以一丸著牙上咬咀常暮卧時服亦可日三服忌生葱猪肉蘆笋

又小胡椒丸療寒冷欬逆胷中有冷咽中如有物狀吐之不出方

胡椒五分　乾薑六分　款冬花三分

右三味擣篩蜜和丸如梧子大米飲服三丸日再服以知爲度禁如前法並出第十卷中

十欬方六首

千金問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證何以爲異師曰欲語因欬言不得終謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脉反遲謂之支欬欬引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止下引少腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬夫風欬者下之寒欬支欬肝欬灸足太衝心欬灸刺手神門脾欬灸足太白肺欬灸手太泉腎欬灸足太谿膽欬灸足陽陵泉厥陰欬灸手太陰留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬者時如小兒瘈瘲狀夫久欬爲水欬而時發熱脉在九菽一云卒弦者非虛也此爲胷中寒實所致也當吐之欬家其脉弦欲行吐藥當相人彊弱無熱乃可吐耳

又欬家其人脉弦爲有水可與十棗湯下之不能卧出者陰不受邪故也

又夫有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯方

芫花　甘遂　大戟並熬等分

右三味擣下篩以水一升五合煑大棗十枚取八合絞去滓內藥末彊人取重一錢羸人半錢匕頓服之平旦服而不下者明旦更益藥半錢下後自補養古今錄驗同（此方仲景傷寒論方）

又欬而引脅下痛者亦十棗湯主之（用前方）

又夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脉沈者不可發汗久欬數歲其脉弱者可療實大數者死其脉虛者必苦冒也其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗發汗出則厥逆冷

又欬逆倚息不得卧小青龍湯主之

麻黃（去節）　芍藥　細辛　桂心

乾薑　甘草（炙各三兩）　五味子（半升）　半夏（半升洗）

右八味切以水一斗先煑麻黃減二升去沫乃內諸藥煑得三升去滓服一升若渴者去半夏加栝樓根三兩微利者去麻黃加芫花如雞子大熬黃若食飲噎者去麻黃加附子一枚炮去皮六片破小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏人半升去尖皮兩人者熬芫花不主利麻黃止喘今語反之疑非仲景意加減忌海藻菘菜生葱生菜羊肉餳（此本仲景傷寒論方）

青龍下已多唾口燥寸脉沈而尺脉微手足厥逆氣從少腹上撞胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者可與茯苓桂心甘草五味子等湯主之治其氣撞方

茯苓（四兩）　桂心（一兩）　甘草（三兩炙）　五味子（半升）

右四味切以水八升煑取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜生葱（以千金校之亦脫此方今於仲景方錄附之）

衝氣則抵而反更欬胸滿者與茯苓甘草五味子去桂心加乾薑細辛以治其欬滿方

茯苓四兩　甘草炙　乾薑　細辛各三兩
五味子半升
右五味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘
菜生菜醋物等
欬滿即止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥此法不
當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復
內半夏以去其水方
茯苓四兩　甘草炙　乾薑　細辛各三兩
五味子半升　半夏洗半升
右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘
菜生菜羊肉餳酢等
水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐痺故不內麻黃乃
內杏人也若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛
麻黃發其陽故也方
茯苓四兩　乾薑三兩　細辛三兩　五味子半升
半夏洗半升　杏人半升去尖皮兩人者　甘草炙三兩
右七味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘
菜生菜羊肉餳酢等
若面熱如醉狀者此爲胃中熱上衝熏其面令熱加大黃利之方
細辛　甘草炙　乾薑各三兩　茯苓四兩
五味子　半夏洗　杏人去皮尖各半升　大黃三兩蒸
右八味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海
藻菘菜生菜餳醋羊肉並出第十八卷中

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

病源久欬嗽上氣者是肺氣虛極風邪停滯故其病積月累年
久不差則胷背痛面腫甚則唾膿血也出第十四卷中

深師療肺氣不足欬逆唾膿血咽喉悶塞胷滿上氣不能飲食卧則短氣補肺湯方

款冬花三兩 桂心二兩 鍾乳二兩 乾薑二兩

白石英二兩 麥門冬去心四兩 五味子三兩 粳米五合

桑根白皮一斤 大棗一百枚擘

右十味切以水一斗二升先煑桑白皮棗令熟去滓内藥煑取二升二合分三服忌生葱等千金同

又療欬逆上氣時時唾濁但坐不得卧皂莢丸方

長大皂莢一挺去皮子炙

右一味擣篩蜜和服如梧子一丸日三夜一以大棗膏和湯下之千金經心録延年同此本仲景傷寒論方一名棗膏丸

又療欬逆上氣吐膿或吐血胷滿痛不能食補肺湯方

黃耆一法五兩 桂心 乾地黃 茯苓

厚朴 乾薑 紫菀 橘皮

當歸 五味子 遠志去心 麥門冬去心各三兩

甘草炙 鍾乳 白石英各二兩 桑根白皮

人參各三兩 大棗二十枚擘

右十八味切以水一斗四升煑取四升分溫四服日三夜一忌海藻菘菜生葱醋物千金同並出第十八卷中

古今録驗療寒冷欬嗽上氣胷滿唾腥膿血四味石鍾乳散方

鍾乳碎研 白礜石鍊 款冬花 桂心各一分

右四味擣合下篩以筩吸之如大豆許七聚先食日三不知稍增之數試有驗當作七聚遂吸之忌生葱千金集驗同出第十九卷中

必効療上氣唾膿血方

灸兩乳下黑白際各一百壯良千金同

欬嗽膿血方一十一首

病源欬嗽膿血者損肺傷心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陽脉則有血血與氣相隨而行欬嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也

出第十四卷中

廣濟療瘕瘷吐膿損肺方

人參二分 瓜蔕三分 杜蘅五分

右三味擣篩爲散平旦空腹以熱湯服方寸匕當吐淡水惡汁一二升吐已復煑白粥食淡水未盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚肘後古今錄驗用杜蘅三分人參一分服一錢匕出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方

雞子一枚 甘草二分炙 甘遂一分 大黃二分 黃芩二分

右五味切以水六升煑取二升去滓内雞子攪令調盡飲之忌海藻菘菜

又療傷肺唾血方

茅根

右一味擣篩爲散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴

出第四卷中

刪繁療肺偏損胷中應肺偏痛唾血氣欬款冬花散方

款冬花 當歸各六分 桂心 芎藭

五味子 附子各七分炮 細辛 貝母各四分

乾薑 乾地黃各八分 白朮 甘草炙

杏人各五分去尖皮 紫菀三分

右十四味擣篩爲散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜

桃李雀肉海藻菘菜猪肉蕪荑出第五卷中

千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方

百部根二兩 升麻半兩 桂心 五味子

甘草炙 紫菀 乾薑各一兩

右七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日三以知為度忌生葱

海藻菘菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸澀背氣不欲食惡風目闇䀮䀮足膝

脛寒湯方

乾地黃半升切 桑白皮二升切 芎藭一升切 白膠五兩

桂心二尺 人參 紫菀各二兩 大棗二十枚擘

生薑五兩 飴糖一升 大麻人一升 大麥三升

右十二味切以水一斗五升煮麥濾取一斗去滓內藥煎取

三升分三服忌生葱

又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方

好酥五十斤

右三遍錬停凝當出醍醐服一合日三以差止

又方

三遍錬酥如雞子黃適寒温灌鼻中日二夜一

又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方

杏人二升去尖皮兩人者 猪脂二合 糖一升 生薑汁二升

蜜一升

右五味先以猪膏煎杏人黃黑出以紙拭令淨擣如膏合煎

五物令可丸服如杏核日夜六七漸漸加之並出第十八卷中

古今錄驗瀉肺湯療肺中膿欬唾血氣急不安卧方

芎藭 麻黃去節 細辛 椒汗

當歸各一兩

外臺秘要九

右五味切以水七升煮取三升分爲三服日三微汗或吐膿
血忌生菜一方有生薑一兩
又羊肺湯療欬晝夜無閑息氣欲絶肺傷唾血方
鍾乳五兩　牡蠣熬　桂心六兩　射干
桃人去尖皮　貝母　橘皮　百部根
五味子各三兩　生薑六兩　白石英　半夏洗各五兩
款冬花　甘草炙　厚朴炙各二兩　羊肺一具
右十六味切先以水二斗三升煮羊蹄取一斗去肺內諸藥
煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第
十九卷中

久欬嗽膿血方四首

病源久欬嗽膿血者肺感於寒微則成欬嗽欬嗽極甚傷於經
絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿
相雜而出也出第十四卷中

廣濟療積年欬嗽膿血方
莨菪二升　大棗一百顆青州者
右二味以水三大升取馬糞燒火煎熟之候令汁盡取棗旱
晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾脣熱則以爲
度不吐不利忌並如前法
又療欬經年不差氣喘欲絶傷肺見血方
桑白皮切三合　白羊肺一具切　芍藥十分　款冬花六分
茯苓十二分　貝母十二分　麥門冬六分　杏人六分去尖皮熬爲脂
升麻十二分　生地黃汁一升　黃芩十二分　蜜一升
右十二味切以水一斗煮取三升去滓內杏人脂地黃汁蜜
等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布
濾每食後含一合日夜三四度老小以意減之微煖含之佳

忌生冷油醋䴵魚蒜蕪荑並出第二卷中

深師療欬逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣連年款冬花丸方

款冬花十八分 紫菀十二分 杏人八分去尖皮兩人者熬 香豉十分熬

人參二分 甘草三分炙 蜀椒三分汗 天門冬六分去心

乾薑 桂心 乾地黃各三分

右十一味擣篩蜜和如彈丸含稍稍嚥汁日四夜再神良忌海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚出第十八卷中

近効療久欬兼唾血方

白前三兩 桑白皮 桔梗各二兩 甘草一兩炙

右四味切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十數劑忌猪肉海藻菘菜李子劍方

欬嗽唾粘方二首

廣濟療肺熱欬嗽涕唾多粘甘草飲子方

甘草六分炙 款冬花七分 豉心一合 生麥門冬八分去心

葱白一握 檳榔十顆合子碎 桔梗六分 地黃汁半升

右八味切以水六升煮取二升絞去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里進一服不利忌生菜熱䴵炙肉海藻菘菜魚蒜粘食猪肉蕪荑出第二卷中

延年紫蘇飲療欬嗽短氣唾涕稠喘乏風虛煩損發無時者宜服此方

紫蘇 貝母各二兩 紫菀一兩 麥門冬一兩去心

棗五枚擘 葶藶子一兩熬令黃別擣 甘草一兩炙

右七味切以水六升煮取二升分爲四服每服如人行七里禁猪魚肉蒜海藻菘菜出第五卷中

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有熱嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲氣嗽

熱嗽者年少力壯體氣充滿將息傷熱積熱所成故致熱嗽此但食飲取冷兼以藥壓之自歇冷嗽者年衰力弱體氣虛微如復寢食傷冷故成冷嗽此亦但將息以温兼進温藥則當平復肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺癰若此將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停澄在胷水氣上衝衝入於肺肺得此氣便成嗽久而不除漸成水氣若作此病亦難療之熱嗽之狀更無其餘但遇於熱便發此者宜合生地黃等七味湯服之方

生地黃一升切　生薑二合切　桑根白皮切一升　射干切二升

乾葛切六合　紫蘇三合　竹瀝一升

右藥細切六味以水一斗煑取三升去滓內竹瀝攪調每食後良久則服之分一劑作四服若覺可則重合服之病輕者三數劑則差忌蕪荑

又依前生地黃等七味飲雖得暫差於後還發宜合紫菀等十味丸方

紫菀五分　桑白皮六合　射干四兩　百部根五兩

麻黃二兩去節　乾葛五兩　地骨皮　升麻各四兩

乾地黃六兩　芒消六兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子以竹瀝下之初服十五丸日再服稍稍加至三十丸忌蕪荑

又冷嗽之狀但遇諸冷此疾便發有如此者宜合大棗等七味湯主之方

大乾棗三十枚擘　桂心四兩　杏人一百枚去尖皮兩人研　細辛五兩

吴茱萸　當歸各三兩

右藥切以水八升煑取二升六合去滓温分三服每服如人

行十里久服一劑覺得力至三四劑亦佳隔三四日服一劑

此湯元欠一味忌生葱生菜

又依前大乾棗湯服之雖可未能斷其根遇冷便發宜合當歸等十味丸服之方

當歸切 細辛 甘草炙各五兩 桂心

吴茱萸 人參各三兩 蜀椒三合汗 橘皮

乾薑各四兩 桑白皮八兩

右藥擣篩蜜和丸煮乾棗飲下之初服十丸日再服稍加至三十丸如梧子服此丸經三五日覺熱每服藥後良久喫三數口粥食壓之忌海藻菘菜生葱生菜

又肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜嗽常不斷唾白如雪細末稠粘喘息氣上乍寒乍熱發作有時脣口喉舌乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成蒸有此狀者宜合白前等七味湯服之兼有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎

又肺氣嗽經久有成肺癰者其狀與前肺痿不多異但唾悉成膿出無多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃耆三兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芎藭三兩於桑白皮煎中加黃耆切三升共桑白皮地骨皮同煎又加水三升同煎忌羊肉餳

白前湯方

白前三兩 桑白皮五兩 生地黃一升 茯苓五兩

地骨皮四兩 麻黃二兩去節 生薑六兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓加竹瀝五合分溫四服食後服之晝三夜一覺得力重合服五六劑佳隔三日服一劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜合麻黃等十味丸服之方

麻黃二兩去節　白前二兩　桑白皮六兩　射干四兩

白薇三兩　百部根五兩　乾地黃六兩　地骨皮五兩

橘皮二兩

右藥擣篩蜜和丸者煑桑白皮飲下之初服十丸日再服稍稍加至十五丸丸如梧子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在肓膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在上已晝服丸夜無憑準宜合桑白皮汁等十味煎每夜含咽之方

桑白皮一升切　地骨皮三升切

二味用水七升熟煎取三升汁去滓澄清

生地黃汁五升　生麥門冬汁二升　生薑汁一升　竹瀝三升

生葛根汁三升　白蜜一升　牛酥三合　大棗膏一升

右八味先於微火上取生地黃汁以下生葛汁以上和煎減半則內桑白皮等二物汁和煎之三分減一則內酥蜜棗膏攪之勿停手得如稠飴狀煎成訖置別器中服之每夜欲卧時取一胡桃大含之細細嚥汁稍加至雞子大欲晝日間丸服亦得忌蕪荑

又飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動嗽物便致困劇甚者乃至雙眼突出氣即欲斷汗出大小便不利吐淡飲涎洟沫無復窮限氣上喘息肩息每旦眼腫不得平眠有如此者宜合細辛等八味湯葶藶子十五味丸服之方

細辛　半夏洗　桂心　桑白皮各五兩

乾薑　當歸各四兩　芒消六兩　杏人六合去尖兩人者研

右藥切以水九升煑取三升去滓內芒消分溫三服每服如

人行十里久當得快利後好將息經三四日合丸服之忌生
葱生菜羊肉餳
丸方
葶藶子六合熬　細辛　五味子各五兩　乾薑
當歸各四兩　桂心　人參　丁香
大黃　商陸根各三兩　橘皮四兩　桑白皮六兩
皂莢肉二兩炙　大腹檳榔二十枚　麻黃二兩去節
右藥擣篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十丸日再服稍加至
十五丸如梧子大若利則減祕則加以大便通滑爲度時時
得鴨溏亦佳忌生葱生菜
又依前細辛等八味湯葶藶子等十五味丸不覺可漸成水
病餘一如前況更加大小便祕澀頭面身體浮腫宜合大乾棗
三味丸服之方

大棗六十枚擘去核　葶藶子一升熬　杏人一升去尖皮兩人者熬
右藥合擣令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作丸依
還以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍稍加之以大便通
爲度病重者時令鴨溏佳亦有以前三味煮湯服之
又依前大棗等三味丸服雖覺氣暫歇然病根深固藥力微
弱且停服大棗丸合巴豆丸五味細細服之蕩滌宿病方
巴豆二十枚熬去心皮　杏人一百顆去尖皮兩人者熬　牽牛子五合熬　葶藶子六合熬
大棗六十枚擘去核
右藥合擣一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三四丸
日再稍加利即減祕即加常以大便調爲候病甚時時取鴨
溏亦佳忌蘆笋野豬肉呉昇同出下卷中
雜療欬嗽方三首
古今録驗五藏六腑皆令人欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜

受邪故肺獨易爲欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脅痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如鯁狀甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脅痛陰陰則引肩背甚者不得動動便欬劇脾欬經久不已則傳入胃其狀欬即嘔甚則長蟲出久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間入腑藏爲欬上氣如此也又非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脅又痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服温藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也

又療欬嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲者方

吳茱萸 五味子 大黃 桂心
甘草炙 細辛 人參 紫菀
款冬花各一兩 大戟 竹茹各三分

右十一味切以水一斗煮取三升分爲三服亦療陰冷欬至良忌海藻菘菜生菜生葱深師同並出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絕杏人煎方

杏人四兩去尖皮末 豬膏二斤 白蜜二升 生薑汁三升

右四味著銅器中於微火上先煎薑汁次内蜜膏令如餳置器著地乃内杏人末復令得一沸煎成服如棗大一丸含之日三不知稍稍增之

又療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔蘇子湯方

蘇子一升 乾薑三兩 半夏四兩洗 桂心

人參各二兩 橘皮 茯苓各三兩 甘草一兩炙

右八味切以水八升煮取二升半分爲三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黃芩二兩忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物等

並出第十八卷中

外臺秘要方卷第九

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘

國立故宮博物院 NATIONAL PALACE MUSEUM

外臺祕要方卷第十 肺痿肺氣上氣欬嗽二十八門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

肺痿方一十首
肺氣客熱方二首
肺熱兼欬方七首
肺虛寒方三首
肺氣不足口如含霜雪方四首
肺脹上氣方四首
肺氣積聚方二首
肺癰方九首
大腸論二首
大腸熱實方三首
大腸虛寒方三首

皮虛實方二首
上氣方九首
卒上氣方六首
久上氣方四首
上氣胷滿方二首
上氣欬身面腫滿方四首
上氣喉中水雞鳴方一十二首
因食飲水上氣方四首
卒短氣方四首
上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首
欬嗽上氣方八首
欬逆上氣嘔吐方四首
上氣欬嗽多唾方三首
上氣欬方一首
久欬嗽上氣方三首
欬逆上氣方五首
雜療上氣欬嗽方四首

肺痿方一十首

千金論曰寸口脉數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此爲肺痿之病何從得之師曰病熱在上膲因欬爲肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難被駃藥下利重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不濇三膲踟蹰入而不出身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此爲肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脉浮弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以

然者上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也出第十七卷中

仲景傷寒論療肺痿吐涎唾不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲冷必眩甘草乾薑湯主之以温其臟方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味切以水三升煑取一升半分温二服服湯已小温覆之若渴者屬消渴忌海藻菘菜

又療肺痿涎唾多心中温温液液者炙甘草湯方

甘草四兩炙　生薑三兩去皮　人參二兩　地黃一斤

阿膠三兩炙　大麻子人半升　大棗四十枚擘　麥門冬半升去心

桂心二兩

右九味切以美酒七升水八升相和先煑八物取四升絞去滓内膠上微火烊銷温服七合日三夜一忌海藻菘菜蕪荑並出第八卷中

肘後療肺痿欬嗽吐涎沫心中温温咽燥而渴者方一云不渴

生天門冬一升擣取汁　酒一升　飴糖一斤　紫菀四兩末

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏人一丸日三忌鯉魚出第一卷中范汪經心録同

集驗療肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方一云不渴

生薑五兩　人參三兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右四味切以水五升煑取一升半分再服忌海藻菘菜仲景傷寒論備急范汪千金經心録同

又療肺痿欬嗽涎沫心中温温咽燥而渴方一云不渴

生薑五兩　甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右三味切以水五升煑取一升半分再服一方乾薑三兩代

生薑忌海藻菘菜文仲千金古今録驗同深師云温脾湯范

汪亦同

又療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急方

童子小便毎日晩取之去初末少許小便可有五合

取上好甘草量病人中指節男左女右長短截之炙

令熟破作四片内小便中置於閑浄處露一宿器上

横一小刀明日平旦去甘草頓服之毎日一劑其童

子勿令喫五辛忌海藻菘菜熱麪並出第四巻中

删繁療虚寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方

半夏一升湯洗四破 母薑一斤 橘皮一斤 白朮八兩

桂心四兩

右五味切以水九升煮取三升去滓分温三服忌羊肉餳桃

李雀肉生葱一方有桑白皮切一升

又療凡虚寒肺痿喘氣乾地黄煎方

乾地黄五兩 桑根白皮切二升 芎藭五兩 桂心

人參各三兩 大麻人一升熬研爲脂

右六味切以水九升先煮五味取三升去滓内大麻人煎數

沸分三服忌生葱蕪荑並出第二巻中

千金療肺痿涎唾多出心中温温液液甘草湯方

甘草二兩炙

右一味切以水三升煮取一升半分温三服忌海藻菘菜范

汪同

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方

桂心三兩 甘草二兩炙 大皂莢一挺去皮子炙 生薑三兩

大棗十二枚擘

右五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻菘

章楷

菜范汪經心録同並出第十七卷中

肺氣客熱方二首

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安方

百部根一兩半 天門冬二兩去心 紫菀一兩半 貝母

乾葛 白前 橘皮各一兩 生薑二兩

葱白三合切 豉三合

右十味切以水六升煑取一升七合去滓分溫三服踈數任

情亦可分爲四服欲間食亦得禁生冷鯉魚蒜出第五卷中

古今録驗療肺客熱并肝心家氣人參湯方

桂心 甘草各三兩炙 人參 乾薑

防風各二兩 白术一兩

右六味切以水八升煑取三升分三服日三宜溫忌桃李雀

肉生葱海藻菘菜出第二十一卷中

肺熱兼欬方七首

刪繁療肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方

橘皮 杏人四兩去尖皮 柴胡 麻黄去節各三兩

乾蘇葉二兩 母薑四兩去尖 石膏八兩研綿裹

右七味切以水九升先煑麻黄兩沸除沫下諸藥煑取三升

去滓分三服不差頻以兩劑千金同出第五卷中母薑千金云宿薑

千金療肺熱悶不止胷中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥

泄胷中喘氣方

桃皮一斗 芫花一斗

右二味以水四斗煑取一斗去滓以故布手巾內汁中薄胷

溫四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汁

出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名肺熱實也

又療肺熱實胷憑仰息泄氣除熱湯方

枸杞根皮(二升) 白前(三兩) 石膏(八兩綿裹碎) 杏人(三兩去雙人尖皮研)
橘皮 白朮(各五分) 赤蜜(七合)

右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黃(切二升) 石膏(八兩) 淡竹茹(如雞子大一枚) 杏人(四兩去尖皮兩人研)
羚羊角(屑三兩) 芒消(三兩) 赤蜜(一升) 麻黃(五兩去節)
升麻(三兩)

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服忌蕪荑出第十七卷中

延年天門冬煎主肺熱兼欬聲不出方

生天門冬(汁一升) 生地黃(汁五合) 白蜜(五合) 牛酥(三合)
白糖(五兩) 杏人(一升去尖皮研取汁) 貝母 紫菀
通草(各三兩) 百部根 白前 甘草(炙)
人參 橘皮(各二兩)

右十四味切以水六升煮貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍強取如雞子黃大含嚥之日四五度忌鯉魚蕪荑海藻菘菜等張文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱兼欬方

生地黃汁(三升) 生麥門冬(三升) 生薑汁(一合) 酥(二合)
白蜜(二合)

右五味先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜煎如稀餳內貝母末八分紫菀末四分攪令調一服一匙日二服夜一服忌蕪荑

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方

天門冬三兩去心　麥門冬二兩去心　款冬花一兩　貝母一兩

紫菀二兩　茯苓二兩　升麻二兩　生薑汁三升

蜜一升　酥一合　地黃汁三升

右十一味切以水八升煑七物取一升去滓內生薑地黃汁煑取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成煎一服如彈丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物蕪荑鯉魚等顔仁楚處

又羚羊角飲主肺熱胸背痛時時乾欬不能食方

羚羊角二兩屑　貝母　生薑　茯苓各三兩

橘皮　人參　芍藥各二兩

右七味切以水五升煑取一升八合去滓分溫三服每服如人行八九里久更服禁生冷蒜麪醋並出第五卷中

肺虛寒方三首

刪繁療肺虛寒癘風所傷聲音嘶塞氣息喘憊欬唾酥蜜膏酒止氣欬通聲方

酥　崖蜜　飴糖　生薑汁

生百部汁　大棗肉研爲脂　杏人熬去皮尖研爲脂各一升　甘皮五具末

右八味合和微火煎常攪三上三下納一炊久薑汁并百部汁各減半停下溫清酒一升服方寸匕細細嚥之日夜三千金同出第六卷中

千金療肺虛寒癘風傷語音嘶塞氣息喘憊嗽唾方

猪胰三具　大棗一百枚去核　好酒五升

右三味以酒漬二味秋冬七日春夏三日生布絞去滓二七日服盡二七日忌鹽餘如藥法暖將息無猪胰以羊胰代肘後張文仲備急同出第十八卷中

又凡右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不

足以息嗌乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉絞弱虛瘠風入肺防風散方

防風　獨活　芎藭　秦椒汗

黃耆各七分　附子炮七分　乾薑七分　石膏研

天雄炮　甘草炙　山茱萸　麻黃去節

五味子各六分　秦艽　桂心　署預

杜仲　人參　防已各五分　貫衆二枚

紫菀　菊花各四分　細辛五分　當歸五分

右二十四味擣篩爲散酒服方寸匕日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜出第十七卷中一方無石膏當歸

肺氣不足口如含霜雪方四首

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者吐血

苦寒五味子湯方

五味子三兩　大棗五十枚擘　桑根白皮一升　藁本二兩

鍾乳三兩綿裹　款冬花二兩　雞蘇二兩

右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如人行八里進一服不利忌猪魚炙肉熱麪陳臭等物此方甚良

又療肺氣不足逆氣胷滿上迫喉咽閉塞短氣連唾相屬寒從背起口如含霜雪語無音聲劇者唾血腥臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫菀湯方

紫菀　五味子　生薑切合皮　白石英碎綿裹

款冬花　桂心　人參各二兩　鍾乳碎綿裹

麥門冬去心　桑根白皮各三兩　大棗二十枚擘　粳米一合

右十二味切水一斗五升先煮桑根白皮粳米取九升去滓内諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去如人行七八里久

喫之不利忌生葱熱麪炙肉並出第二卷中（深師千金無紫菀人參）

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子（三兩） 乾薑（二兩） 款冬花（二兩） 桂心（一尺）

麥門冬（一升去心） 大棗（一百枚擘） 粳米（二合） 桑根白皮（一斤）

右八味切以水一斗二升先煮棗并桑白皮粳米五沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱千金同出第十八卷中

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方

五味子 白石英（末綿裹） 鍾乳（末同上） 桂心

橘皮 桑根白皮（各三兩） 粳米（二合） 茯苓

竹葉 款冬花 紫菀（各二兩） 大棗（五十枚）

杏人（五十枚去兩人尖皮） 蘇子（一升） 生薑（五兩） 麥門冬（四兩去心）

右十六味切以水一斗三升先煮桑白皮棗粳米熟去滓內諸藥煮取四升分三服日再夜一服忌大酢生葱千金同出第四卷中

肺脹上氣方四首（五法）

廣濟療患肺脹氣急瘕嗽喘麤眠卧不得極重恐氣欲絕紫菀湯方

紫菀（六分） 甘草（八分炙） 檳榔（七枚） 茯苓（八分）

葶藶子（二合熬末湯成下）

右五味切以水六升煮取二升半絞去滓分温三服每服如人行四五里久進之以快利爲度忌生葱菜熱麪海藻菘菜大醋蒜粘食出第二卷中

仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脈浮者以心下有水宜服小青龍湯加石膏主之方

麻黃三兩去節 五味子半升 石膏碎綿裹 乾薑
芍藥 細辛各三兩 桂心 甘草各三兩炙
半夏半升洗
右九味切以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服強人一升瘦人及老小以意減之日三夜一忌生葱生菜海藻菘菜羊肉餳等
又肺脹者病人喘目如脫狀脉浮大也肺脹而欬者越婢加半夏湯主之方
大棗十五枚擘 半夏半升洗 生薑三兩 麻黃六兩去節
甘草二兩炙 石膏半斤碎綿裹
右六味切以水六升先煮麻黃三二沸去沫內諸藥煮取二升去滓溫服八合日三不知更作之忌海藻菘菜羊肉餳並
出第十八卷中

深師療欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣小青龍湯加石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍湯方用前仲景方
千金療肺脹欬嗽上氣咽燥脉浮心下有水麻黃湯方
麻黃去節 芍藥 生薑一法五兩 細辛
桂心各三兩 半夏半升洗 石膏四兩碎綿裹 五味子半升
右八味切以水一斗煮取三升分三服忌生葱羊肉餳生菜
集驗同出第十七卷中

肺氣積聚方二首

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即欬逆上氣方
麻黃三兩去節 杏人去雙人尖皮 柴胡 生薑
半夏十遍洗 葶藶子熬研如脂湯成各四兩 乾棗十二枚擘
檳榔十枚并子碎
右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分溫三服每服相

去如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉餳

又方

茯苓　乾蘇莖葉　橘皮　麻黄各三兩　杏人去尖皮兩人者　柴胡　生薑各四兩

右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分温三服每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麪猪肉五日服一劑並出第六卷中

肺癰方九首

千金論曰病欬唾其脉數實者屬肺癰虚者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此爲浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胷中隱隱痛脉反滑數此爲肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死後終吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時振寒熱之所過血爲凝滞蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數趺陽脉緊寒熱相摶故振寒而欬趺陽脉浮緩胃氣如經此爲肺癰趺陽脉浮緩少陰微緊微爲血虚緊爲微寒此爲鼠乳其病屬肺也問曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此爲癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胷中者爲肺癰其脉數欬唾設膿未成其脉自緊數緊去但數膿爲已成也出第十七卷中

仲景傷寒論欬胷中滿而振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散主之方

桔梗三分　貝母三分　巴豆一分去皮心熬研作脂

右三味擣篩強人飲服半錢匕羸人減之若病在膈上者必
吐膈下者必利若利不止者飲冷水一杯則定忌猪肉蘆笋
出第十八卷中

集驗療胷中滿而振寒脉數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久
久吐膿如粳米粥是爲肺癰桔梗湯方

桔梗 二兩千金古今方云用一枚　甘草 二兩炙

右二味切以水三升煑取一升分再服朝暮吐膿血則差張
文仲千金備急古今録驗范汪同忌海藻菘菜猪肉冷水出
第四卷中此本仲景傷寒論方

千金療欬有微熱煩滿胷心甲錯是爲肺癰黄昬湯方

黄昬 手掌大一枚是合昬木皮

右一味切以水三升煑得一升分再服范汪同

又肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之兼療胷脇脹滿一身
面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞方

葶藶 三熬令色

右一味擣令可丸以水三升煑擘大棗二十枚得汁二升内
藥如彈丸一枚煎取一升頓服古今録驗刪繁仲景傷寒論
范汪同並出第十七卷中

備急療腸癰肺癰方

升麻　白斂　漏蘆　芒消 各一兩
黄芩　枳實 炙　連翹　蛇銜 各三兩
梔子 二十枚擘　蒴藋根 四兩

右十味擣令細以水三升漬經半日以猪脂五升煎令水竭
去滓傅之日三若交急合水煎出第四卷中

古今録驗療肺癰方

薏苡人 一升　醇苦酒 三升

右二味煑取一升溫冷頓服有膿血當吐范汪經心録同

又療肺癰葦湯方

剉葦一升 薏苡人半升 桃人五十枚去皮尖兩人者 瓜瓣半升

右四味㕮咀以水一斗先煑葦令得五升去滓悉內諸藥煑取二升分再服當吐如膿仲景傷寒論云葦葉切二升千金范汪同千金云葦莖二枚以水二斗煑五升

又療肺癰經時不差桔梗湯方

桔梗三升 白朮二兩 當歸一兩 地黃二兩

甘草炙 敗醬 薏苡人各二兩 桑白皮切一升

右八味切以水一斗五升煑大豆四升取七升汁去豆內清酒三升合諸藥煑之取三升去滓服七合日三夜再服忌猪肉蕪荑桃李雀肉海藻菘菜等

又療肺癰生地黃汁湯方

生地黃汁一升 當歸 甘草炙 白石英綿裹

人參各一兩 附子二分炮 白小豆二十顆 白雞一頭男用雌女用雄療如食法一作雉

右八味切以水一斗五升煑雞取七升汁去滓內地黃汁諸藥等煑取三升去滓分服六合日三夜二忌蕪荑海藻菘菜冷水猪肉等並出第二十一卷中

大腸論二首

千金論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以爲候也肺所以合氣於大腸大腸者大腸爲行道傳寫之腑也號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸臍右迴疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神又曰肺前受病移於大腸肺欬不已則大腸受之大腸欬則遺失便利肺應皮皮厚即大腸厚皮薄即大腸薄皮緩腹裹大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結删繁同

又扁鵲云大腸絕不療何以知之洩痢無度痢絕則死實即腸熱熱則脹滿不通口爲生瘡食下入腸則腸實而胃虛下胃則胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則腸寒寒則腸中雷鳴洩青白之痢而發於氣水根在大腸大腸有寒鶩溏有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬曰重感於寒則洩當臍而痛不能久立與胃同候腸中雷鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸也大腸脹鳴而痛腸寒即洩食不化出第十八卷中

大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

又療大腸實熱腹脹不通口爲生瘡生薑洩腸湯方

生薑　橘皮　青竹茹　白朮

黃芩　梔子(擘各三兩)　桂心(一兩)　生地黃(十兩)

茯苓　芒消(各二兩)　大棗(十四枚擘)

右十一味切以水七升煮取三升去滓下芒消分三服忌生葱蕪荑海藻菘菜醋物桃李雀肉等出第十八卷中

刪繁療肺脉厥逆大於寸口主大腸熱欬上氣喘鳴心煩麻黃湯方

麻黃(六兩去節)　芍藥　生薑　半夏(洗十遍)

細辛　五味子(各三兩)　桂心(二兩)　石膏(八兩碎綿裹)

右八味切以水九升先煮麻黃七八沸去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服忌羊肉餳生葱生菜等

又療大腸熱甚胷滿掌中熱淡竹葉飲泄熱氣方

淡竹葉(切三升)　橘皮(三兩)　乾蘇葉(三兩)　白朮(四兩)

甘草(一兩炙)　葱白(切一升)　桂心(一兩)　石膏(六兩碎綿裹)

杏人六十枚去皮尖熬

右九味切以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓澄清取九升下諸藥煮取三升絞去滓分三服若須利下內芒消三兩忌海藻菘菜桃李雀肉生葱並出第二卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胷中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛寒也

又療大腸虛寒痢下青白腸雷鳴相逐黃連補湯方

黃連四兩　茯苓四兩　芎藭三兩　醋石榴皮四枚

地榆五兩　伏龍肝如雞子大一枚是竈心內土研

右六味切以水七升煮五味取二升五合去滓下伏龍肝屑攪調分三服忌猪肉冷水大醋出第十八卷中

刪繁療大腸虛寒欠呿欬氣短少腹中痛款冬花丸方

款冬花七分　桂心　五味子各六分　乾薑

芎藭　甘草炙各五分　附子四分炮　桔梗四分

蘇子五合熬　蜀椒一升　百部汁七合　白蜜一升

乾棗五十枚擘去皮研爲脂　薑汁一升

右十四味細擣爲末將蘇蜜汁和微火上煎取爲丸如梧子每服溫酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱出第二卷中

取

皮虛實方二首

刪繁論曰夫五藏六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓疼痛然陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱即應藏寒即應腑千金同出第三卷中

千金療皮虛主大腸病寒氣關格葫蘿蒸湯方

葫蘿根葉切三升 桃皮葉剉三升 昌蒲葉剉三升

細糠一斗 秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟爲度大盆器貯於上作小竹歷牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席薦障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對中洩氣取通身接汗可作兩食久許如此三日蒸還溫藥足汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火也非惟療寒但是皮膚一切勞冷並皆療之忌羊肉餳删繁同

又療皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子 枳實炙 杏人去兩人尖皮

柴胡 芒消各三兩 生地黃切一升 石膏八兩碎綿裹

淡竹葉切一升 生玄參五兩

右十味切以水九升煑取三升下芒消分三服忌蕪荑删繁同並出第十八卷中

上氣方九首

廣濟療上氣方

葶藶子五合熬紫色別擣如泥 桑根白皮切 大棗二十枚擘

右三味以水四升煑取一升絞去滓內葶藶子泥如棗大煑之三分減一頓服以快利爲度忌如藥法出第二卷中

肘後主上氣方

灸從大推數下行第五節下第六節上空間即灸一處隨年壯祕方深師千金翼文仲同出第三卷中

千金療上氣方

上酥一升 獨頭蒜五顆去皮先以酥煎蒜蒜黃出之 生薑汁一合

右三味同煎使熟空腹服一寸匕溫服之忌熱麪

又方

芥子三升

右一味末之蜜和爲丸寅時井華水服如梧子七丸日二服散亦佳禁如藥法尤忌油麪等並出第十七卷中

必効療上氣方

半夏洗 茯苓各四兩 橘皮 白朮各三兩

生薑五兩 檳榔十顆

右六味切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加甘甘三兩人參二兩前胡三兩紫蘇一兩忌羊肉餳桃李雀肉醋物出第一卷中

古今録驗温中湯療上氣方

甘草三兩炙 桂心四兩 生薑一斤

右三味切以水七升半煎取三升分五服忌生葱海藻菘

尖

又昆布丸療胷滿上氣方

大黃 消石 海藻洗 水銀各一兩

昆布三兩洗 苦瓠瓣四十枚 葶藶半升熬 通草二分

桃人五十枚去皮尖兩人者熬

右九味擣篩以蜜和爲丸如梧子許先食服三丸日再服

又巳試鯉魚湯療上氣方

杏人去兩人尖皮熬 貝母 桂心各三兩 橘皮

人參 甘草炙 厚朴炙 麻黃去節

茯苓 胡麻 白前各二兩 鯉魚五斤

生薑六兩 半夏五兩洗

右十四味切先以水二斗煮魚得一斗二升去魚内藥煎取三升二合分四服日三夜一服忌海藻菘菜醋物羊肉餳生葱等物

又上氣二物散本司馬大將軍方

麻黃（一斤去節） 杏人（一百枚去尖皮雙人熬）

右藥各別擣合和下篩爲散上氣發時服方寸匕可至三方寸匕以氣下爲候不必常服范汪同並出第十九卷中（深師療上氣兼欬）

卒上氣方六首

深師療卒上氣胷心滿塞半夏蘇子湯方

半夏（五兩洗） 蘇子（一升） 生薑（五兩） 大棗（四十枚擘）

橘皮 桂心（各三兩） 甘草（二兩炙）

右七味切以水七升煑取二升七合分三服氣即下忌海藻菘菜羊肉餳生葱

又療卒急上氣胷心滿竹篠下氣湯方

生甘竹篠（一虎口） 石膏（一兩綿） 生薑 橘皮（各三兩）

甘草（二兩炙）

右五味切以水七升煑竹篠取四升半去滓内諸藥煑取二升分二服此方療忽上氣不止者服兩三劑差忌海藻菘菜並出第十八卷中

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絶方

桑根白皮（切三升） 生薑（切半升） 吳茱萸（半升）

右三味切以酒五升煑三沸去滓盡令服之入口則愈千金裞方

又方

麻黃（去節） 甘草（炙各三兩）

右二味切以水三升煑取一升半分三服古今録驗用水八升煑取三升八合忌海藻菘菜差後欲令不發者更取二味并熬杏人五十枚擣篩蜜和丸服四五丸日三文仲肘後范汪同

又療卒上氣氣不復報肩息方

乾薑（三兩㕮咀）

右一味以酒一斗漬服一升日三服

又方

麻黃三兩去節 桂心 甘草炙各一兩 杏人四十顆去尖皮兩人者

右四味切以水六升煑取二升分三服此二方名小投杯湯有氣疾者亦可爲散將服之冷多加乾薑三兩淡唾者加半夏三兩洗之忌海藻菘菜生葱並出第三卷中

乆上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方

莨菪子熬令色變 熟羊肺薄切暴乾爲末

右二味各別擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食空肚服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白粥二口止之隔日一服永差三十日內得煑飲汁作蕪菁羹食之以外一切禁斷文仲肘後同

又療上氣三十年不差方

大棗一百枚去核皮 豉一百二十顆熬 杏人一百顆去兩人尖皮熬 椒三百粒汗末

右四味先擣杏人令極熟後內棗椒豉更擣作丸如棗核大含稍稍嚥之日三夜一並出第十七卷中

近効療乆上氣氣急卧不得方

紫蘇葉二兩 生薑 麻黃去節 杏人去皮尖兩人者碎各三兩

赤茯苓 桑根白皮 葶藶子各二兩熬 橘皮一兩半

右八味切以水八升先煑麻黃去沫下諸藥和煑取二升七合絞去滓分三服每服如人行七八里乆温服之畢服後丸

又丸方

葶藶子六兩熬令紫色

右一味擣如泥丸如梧子大每食後以棗飲下十丸日二服乾棗十顆擘碎以水一升煑取五合去滓用下丸甚効

上氣胷滿方二首

古今錄驗胡椒丸療欬上氣胷滿時復嘔沫方

胡椒　蓽撥　乾薑各三兩　白朮二兩

桂心　高良薑　人參　款冬花

紫菀　甘草炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知爲度忌生冷醋滑猪魚肉蒜桃李雀肉生葱海藻菘菜出第十九卷中

救急茯苓人參散療上氣胷脅滿悶益心力除謬忘永不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有人年四十時因患積痢羸憊不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑平復如舊久服延年益壽方

茯苓二斤去黑皮擘破如棗大清水漬經一日一夜再易水出於日中暴乾逐手並爲散　人參七兩擣篩　甘草一兩炙切　牛乳七升　白沙蜜一升五合

右五味以水五升內甘草煑取二升除甘草澄濾內茯苓緩火煎令汁欲盡次內白牛乳次內人參緩火煎令汁盡仍攪藥令調勿許焦成日中暴乾擣篩爲散以紙盛之温乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當麪忌海藻菘菜大醋並是大斗大升大秤兩也此方極驗合數劑立効出第六卷中

上氣欬身面腫滿方四首

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐卧身面腫不下食銷腫下氣止欬立驗方

葶藶子二十分熬別擣令熟　貝母六分　杏人十二分去尖皮熬別擣

紫菀六分　茯苓　五味子各六分

人參　桑白皮各八兩

右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸日二服甚者夜一服

漸漸加至二三十丸煮棗汁送之若腫氣盛者宜服此藥若
小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶藶子二十分熬令色變別擣極熱　杏人十二分去尖皮熬別擣　茯苓六分
牽牛子八分熬

右四味擣篩蜜和爲丸如梧子許每服八九日再夜一服漸
漸加至二十丸煮棗汁送之大忌醋物

又療上氣欬嗽長引氣不得卧或水腫或遍體氣腫或單面
腫或足腫並主之方

葶藶子三升微熬

右一味擣篩爲散以清酒五升漬之春夏三日秋冬七日初
服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利爲
度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單

莖向上葉端而角角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作
歧生角細長採時必須分別前件六種病狀發動各不同始
終至困並歸於水但人腹內有塊及兩邊皆有者或當心有
塊稍壯大者並是少病即此藥必須得好新熟無灰酒清者始
可用經日多者惡不堪用前件病皆是熱服藥唯須愼酒麪
生冷雞猪魚肉大困及不得卧入口則定老少任意量力必
須好差平復始可停藥此方神驗服藥如傷多悶亂者作土
漿飲即定並出第六卷中

必効療上氣欬嗽腹滿體腫方

取楸葉三升

右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒內下部立
愈出第一卷中

上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胷滿喉中如水雞鳴小投杯湯方

小麥(一升) 麻黃(四兩去節) 厚朴(五兩) 石膏(如雞子大一枚碎綿裹)

杏人(五合去皮尖兩人者切)

右五味以水一斗煮取小麥熟去麥內藥煮取三升分三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累經用甚良

又療上氣脉浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死麻黃湯方

麻黃(八兩去節) 射干(二兩) 甘草(四兩炙) 大棗(三十顆擘)

右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥煮取三升分三服已用甚良忌海藻菘菜等

又療欬逆上氣胷中塞不得息卧不安席牽繩而起咽中如水雞聲投杯湯方

款冬花(二十分) 杏人(四十顆去兩人者及尖皮) 甘草(一兩炙) 大棗(二十顆擘)

桂心(二兩) 麻黃(四兩去節) 生薑 半夏(洗各三兩)

紫菀 細辛(各一兩)

右十味切以水八升煮取二升頓服之一方分再服卧令汗出食粥數口勿飽食神良忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜

又療欬逆上氣鱓嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸方

鍾乳 人參 桂心 乾薑(各八分)

附子(炮) 款冬花 細辛(各六兩) 紫菀(十分)

杏人(四分去皮炙兩人者熬)

右九味擣篩蜜和酒服如小豆二九日三不知稍稍加之忌猪肉冷水生葱生菜等物

又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方

麻黃(六兩去節) 桂心(一兩) 甘草(炙) 杏人(去尖皮各二兩)

生薑(八兩一方用乾薑三兩)

右五味切以水七升煮取三升半分五服已用療欬唾膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱

又療久欬上氣喉中鳴晝夜不得卧貝母散方

貝母三兩 麻黃去節 乾薑各二兩 桂心

甘草炙各一兩

右五味擣篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二匕大劇可至再服酒隨能多少忌海藻菘菜生葱等

又療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常作水雞鳴白前湯方

白前二兩 紫菀 半夏洗各三兩 大戟切七合

右四味切先以水一斗漬之一宿明旦煮取三升分三服忌羊肉餳千金古今錄驗同並出第十八卷中此方十四味全方見水腫欬上氣中

小品療欬逆喉中如水雞聲貝母湯方

貝母 甘草炙各二兩 麻黃去節 桂心各四兩

半夏洗 乾薑各三兩 杏人七十枚去尖皮兩人者熬

右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸內藥煮取三升溫服七合日三忌海藻菘菜生葱羊肉餳古今錄驗同

又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方

射干十二枚 麻黃去節 生薑各四兩 紫菀三兩

款冬花三兩 細辛三兩 五味子半升 半夏如

大棗七枚擘

右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌羊肉餳生菜千金古今錄驗同並出第一卷中此本仲景傷寒論方

必効療痒病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近方

肥皂莢兩挺 好酥用大秤一兩

右二味於火上炙去火高一尺許以酥細細塗之數翻覆令得

余高

所酥盡止以刀輕刮去黒皮然後破之去子皮筋脉擣篩蜜
和爲丸毎日食後服一丸如熟豆日一服訖取一行微利如
不利明旦細細量加以微利爲度日止一服忌如藥法出第
一卷中

古今録驗沃雪湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絶方

麻黄四兩去節 細辛二兩 五味子半升 桂心
乾薑各一兩 半夏如博棊子八枚洗去滑一方四兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓適寒温服一升投杯
則卧一名投杯麻黄湯令人汗出不得卧勿怪亦可從五合
不知稍增日再凡煮麻黄先煎二沸去上沫又内餘藥忌生
葱生菜羊肉餳集驗經心録范汪同

又投杯湯療久欬嗽上氣胷中寒冷不得息食卧不安席每牽
繩而起咽中如水雞聲方

款冬花四十顆 細辛一兩 紫菀三兩 甘草炙
桂心 麻黄去節 乾薑各二兩 五味子半升
杏人四十枚去皮尖兩人者 半夏半升洗

右十味切以水八升煮取二升分再服卧汗出即愈忌海藻
菘菜生葱生菜羊肉餳並出第九卷中

因食飲水上氣方四首

古今録驗宫泰説李將軍兒得病喘息甚難并數上氣呼吸療
之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死
是後乃有婢得之行極而渇飲水多此爲所發起同與五味湯亦
不差然後小差泰因此與三物備急藥半錢吐下得差由此思
惟病之所由以冷水入肺及入腸寒熱不消化結聚逼迫於胃
口故令其呼吸乏氣息不得下過謂喘而上氣息數也宜吐下
之亦可與三物瓜蔕散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差後已爲常用方

巴豆　乾薑　大黄

右藥等分巴豆小熬去心皮合擣下篩服半錢匕得吐下則愈忌野猪肉蘆笋范汪同

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方

瓜蔕三分　杜蘅三分　人參一分

右藥擣篩爲散以温湯服一錢匕老小半之范汪同並出第十九卷中

肘後療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱方

竹葉三斤　橘皮三兩切

右二味以水一斗半煑取三升去滓分爲三服三日服一劑良

集驗用竹葉三兩文仲備急范汪等同

又方

葶藶子一兩熬擣　乾棗四十顆擘

右二味以水三升先煑棗取一升内葶藶子煎取五合大人分一二服小兒分三四服並出第一卷中

卒短氣方四首

肘後卒短氣方

擣韭取汁服一升立愈文仲備急千金同出第一卷中

千金療卒短氣方

枸杞葉二兩　生薑二兩切

右二味以水三升煑取一升頓服之

又方

生薑五兩切　小麥一升

右二味以水七升煑取一升頓服之

楊廣

又方

紫蘇莖葉 切一升 大棗 二七枚擘

右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方加橘皮半兩並出第十七卷中

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣淡上氣氣急及欬方

柴胡 五兩 五味子 橘皮 紫菀

貝母 杏人 去尖皮兩人者熬各三兩 麻黄 四兩去節 甘草 炙

黄芩 各二兩

右九味細切擣令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑半兩切竹葉一兩半以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合内散二兩煎取一升二 去滓分二服平旦空肚服之一服日晩食消後服之每日作一劑不利忌油麪猪犬肉小豆粘滑酸鹹海藻菘菜出第三卷中

肘後療欬上氣喘息便欲絶方

末人參服之方寸匕日五六出第一卷中

深師療上氣及諸逆氣神驗白前湯方

白前 五兩 紫菀 杏人 去尖皮兩人者 厚朴 炙各三兩

半夏 洗 麻黄 去節各四兩 生薑 一斤一方用八兩 人參

桂心 各二兩 甘草 一兩炙 大棗 十四枚擘

右十一味切以水八升煮取二升半分三服良忌海藻菘菜羊肉生葱餳

又療肺氣不足欬嗽上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食飲補肺溢湯方

蘇子 一升 桑白皮 五兩 半夏 六兩洗

人參 甘草 炙 麻黄 去節

乾薑　杏人去尖皮兩人者各二兩　細辛一兩半　桂心三兩
款冬花一兩　射干一兩
右十四味切以水一斗二升煑取三升分五服日三夜再忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜千金同
又療諸欬病上氣胷滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方
鍾乳八分　乾薑六分　款冬花　細辛
桑白皮　半夏洗各四分　貝母　附子炮各五分
蜀椒汗三分　芎藭四分　紫菀八分　杏人三分
右十二味擣篩蜜和服如大豆二丸日三忌冷食猪羊肉餳生菜並出第十八卷中
千金療上氣不得卧神祕方
橘皮　生薑　紫蘇　人參
五味子各五兩

右五味切以水七升煑取三升分三服出第十七卷中一方有桔梗無五味子
古今録驗療積病後暴上氣困篤投柸湯方
石膏四兩碎　甘草二兩炙　五味子三兩　大棗二十枚擘
人參　桂心　半夏洗　杏人去各
麻黃三兩去節　生薑四兩
右十味切以水一斗煑取三升一服六合日三夜一忌羊肉餳海藻菘菜生葱等
又療上氣呼吸牽繩肩息欲死覆柸湯方
麻黃四兩去節　甘草炙　乾薑　桂心
貝母各二兩
右五味切以水八升煑取二升分再服則愈有人先有風患兼有石熱取冷當風飲酒房室體虛末春因天行病至夏中

差尚虛有風熱未除兼藥石勢取過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢腫遊走無定小便不通積服利藥忽吐逆不下食變嗽至掣動百脉狀如嘘唏積日乃變上氣服此方加杏人二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菘菜范汪經心録同出第十九卷中

欬嗽上氣方七首

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此爲邪搏於氣氣擁滯不得宣發是爲有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多涕唾面目浮腫則氣逆也出第十四卷中

深師療上氣欬嗽蘇子煎方

蘇子二升　生薑汁二升　白蜜二升　生地黃汁二升
杏人二升去尖皮兩人者熬

右五味擣蘇子以地黃薑汁澆之絹絞取汁更擣以汁澆復絞如此六七過令味盡去滓熬杏人令黃黑擣令如脂又以向汁澆之絹絞取汁往來六七過令味盡去滓內蜜和置銅器中於重湯中煎之令如飴煎成一服方寸匕日三夜一忌蕪荑千金同

又療欬嗽上氣射干煎方

射干八兩　紫菀半兩　膠飴五兩　細辛半兩
乾薑五兩末　生竹瀝一升　芫花根半兩　桑根白皮八兩
附子半兩炮　甘草半兩炙　白蜜一升半　欵冬花八兩

右十二味先切射干合蜜竹瀝汁煎五六沸絞去滓㕮咀諸藥以水一升四合漬一宿煎之七上七下去滓乃合飴薑末煎令如餔服酸棗一丸許日三夜一不知稍增之忌海藻菘菜猪肉冷水生菜千金同

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏人煎方

杏人五兩去兩人者及皮尖　五味子三合　甘草四兩炙　麻黃一斤去節

款冬花三合　紫菀　乾薑各二兩　桂心四兩

右八味切以水一斗煑麻黃減二升掠去沫乃内諸藥煑取四
升絞去滓又内膠飴半斤白蜜一斤合内汁中攪令相得湯中
煎如飴成先食服如半棗日三不知稍加之忌海藻菘菜生
葱千金同出第十八卷中

崔氏療上氣暴欬方

紫蘇莖葉剉二升　大豆一升

右二味以水四升煑大豆次下紫蘇煑取一升五合分為三服
晝二夜一忌醋鮓鹹酸油膩等出第六卷中

必効主上氣腹脹心胷滿并欬不能食方段明府云極効

枇杷葉一握去毛炙　檳榔三七顆大并皮子碎　生薑二分　高良薑二兩

蜜二合　酥二合

右六味切以水二大升煑取一大升湯成後内酥蜜更煑三五
沸分温三服每服如人行八九里乆甚重者三兩劑任意食之
出第一卷中

救急療上氣欬肺氣胷痛方

杏人三大升去尖皮兩人者　白蜜一大升　牛酥二大升

右三味杏人擣碎於瓷盆中研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂
膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾二升汁以緩
火煎減至於所記處即内白蜜及酥還至木記處藥乃成貯
不津瓷器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服
亦得服一七日唾色變白二七日唾稀三七日欬斷此方非
但療欬兼補虚損去風冷兼悅肌虚白如瓠婦人服之更佳
延年秘錄同出第六卷中

古今錄驗療上氣兼欬蘇子湯方

蘇子一升 五味子五合 麻黃去節 細辛

紫菀 黃芩 甘草炙各二兩 人參

桂心 當歸各一兩 半夏三兩洗 生薑五兩

右十二味切以水九升煑取三升分三服上氣病亦特單煑蘇子及生蘇葉冬天煑乾枝莖葉亦佳忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜出第十九卷中

欬逆上氣嘔吐方四首

病源五藏皆禀氣於肺肺感微寒則成欬嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五藏傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺欬連滯氣動於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而欬嗽者謂之脾欬其狀欬則右脇下痛陰陰引髆背甚則不可動動則欬發脾與胃合脾欬不已則胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑藏也出第十四卷中

深師療欬嗽上氣喉咽中腥臭虛氣攪心頭痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胷中隔塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少療疰并淋通氣丸方

膠飴五斤 蜀椒二升汁 烏頭七分炮 桂心六分

大附子五枚炮 乾薑 人參各四分 杏人一升

天門冬十分 蜈蚣五節去頭炙

右十味末之擣杏人作膏稍稍内藥末擣千過烊膠飴乃内藥中攪令調和合如半棗一枚日六七夜二三服令胷中温爲度若夢與鬼神交通及飲食者全用蜈蚣食不消者加杏人五合有虛氣少腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭二

枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶子一兩熬末之

忌猪肉冷水生葱鯉魚等物千金同

又療上氣欬逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆若墜瘀血上氣匈脅脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人乳飲滯下有邪濕陰不足大小便不利肢節皆痛消石丸方

消石（一升） 乾薑 前胡 大黃（各一斤）

杏人（一升去尖皮熬）

右五味擣篩蜜和飲服如梧子三丸日再五日後心腹諸疾隨大小便去月經絶則通下長蟲數十亦利血及冷熱赤白汁瘤瘕毒惡主之藥利以意消息

又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方

厚朴（三兩炙） 人參（一兩） 半夏（四兩洗） 生薑（八兩）

茯苓 甘草（炙） 橘皮 桂心（各二兩）

枳實（二兩炙）

右九味切以水八升煑取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱醋物並出第十八卷中

必効療上氣欬嗽嘔逆不下食氣上方

橘皮 紫菀（各三兩） 人參 茯苓

柴胡 杏人（去尖皮兩人者各二兩）

右六味切以水六升煑取二升分爲三服患冷加生薑二兩患熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚朴二兩炙忌醋物桃李雀肉等出第一卷中

上氣欬嗽多唾方三首

廣濟療上氣肺熱欬嗽多涕唾方

白前（四分） 生麥門冬（十分去心） 貝母

石膏 甘草（炙） 五味子 生薑（各四分）

黃芩五分 杏人四十顆 淡竹葉切一升 白蜜一匙
右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白蜜更上
火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須利三兩行湯成
後宜加芒消八分忌熱麪炙肉油膩醋食海藻菘菜出第二卷中
古今録驗小紫菀丸療上氣夜欬逆多唾濁方
乾薑 甘皮一作甘草 細辛 款冬花各三分
紫菀三分 附子二枚炮
右六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日再以知爲
度忌冷水猪肉生菜等物
又療欬氣上多涕唾杏人煎方出徐王
杏人大升一升不用去皮
右一味擣碎研取大升三升汁以水和研之煎取一大升酒
服一匙頭日三忌猪雞魚肉胡荽等物並出第十九卷中

上氣欬方一首
古今録驗療欬逆上氣胷滿多唾太醫令王叔和所撰已更御
服甚良効方
乾薑三分 礜石一分泥裹燒半日 蜀椒五分汗 細辛二分
烏頭一分炮去皮 杏人一分去皮尖兩人者熬 吴茱萸四分洗 昌蒲一分
紫菀二分 皁莢一分去皮子 款冬花三分 麻黃四分去節
右十二味擣篩蜜和丸如梧子夜卧吞一丸日二不知加之
療二十年欬不過二十丸便愈御藥也秘在石室不傳忌猪
羊肉餳生菜冷水千金同出第十九卷中一方有桂心三分無麻黃
久欬嗽上氣方三首
肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方
猪胰三具 乾棗一百顆
右二味以酒三升漬數日服二三合至四五服愈服盡此則

差千金同出第三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方 司馬大傅欬常將此服愈

麻黃一斤去節 杏人一百枚 甘草二兩炙 桂心一兩

右四味擣篩別擣杏人如脂内諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至三匕氣發便服即止忌海藻菘菜生葱千金古今録驗同

又療久上氣欬亦療傷寒後欬嗽方

甘草二兩炙切 大棗二十枚擘

右二味以水七升煮取二升分再服數用驗忌海藻菘菜等並出第八卷中 古今録驗名温脾湯

欬逆上氣方五首

病源肺虚感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是爲欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉咽之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欲絶故謂之欬逆上氣出第十四卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絶氣結於胷中心煩躁不安一合湯方

芫花二分熬 桂心 乾薑各五分 甘草炙

細辛各四分 蕘花二分

右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜一又云合湯亦得分六七服一日盡便愈一方有菖蒲四分無蕘花忌海藻菘菜生葱生菜

又療欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時下痢此腹中如絞在臍上下關疝氣上腸使然爲病有氣涌逆蜀椒散方

蜀椒五合去目并閉口者汗 桂心 甘草各一兩炙

通草 半夏洗各三兩

右五味擣篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十八卷中

古今錄驗麥門冬丸主氣逆上氣方

乾薑六分 麥門冬十分去心 昆布洗 海藻洗各六分

細辛 海蛤 蜀椒熬 桂心各四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子以飲服十丸漸加至二十丸日三有人患風虛得冷輒胷中上氣喉中常如吹管聲欬嗽唾清沫將此丸服得差若散服方寸匕日三忌生葱生菜經心錄同

又鯉魚湯療欬逆上氣喉中不利方

生鯉魚一枚重十三斤 熟艾二升 白蜜一升 紫菀

牡蠣熬各四兩 款冬花一升 杏人二十枚去皮尖兩人者 豉一升半

射干二兩 細辛三兩 飴八兩 昌蒲二兩

右十二味㕮咀藥和内魚腹中置銅器中蒸之五斗米餴下藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉餳等

又杏人煎療欬逆上氣方

杏人一升去皮尖兩人者 石斛 乾薑各四兩 桂心

甘草炙 麻黃去節各五兩 五味子 款冬花

紫菀各三兩

右九味擣八味下篩以水一斗先煑麻黃取八升去滓内藥末膠飴半斤蜜一升攪令相得未食服如棗大一枚日三忌生葱海藻菘菜等並出第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽兼水氣癖氣方

葶藶子熬 貝母 桔梗 鱉甲炙

防葵各六分 白朮 茯苓 大戟

枳實炙 紫菀 旋復花 杏人
橘皮各四分 芫花二分 大黃十分 皂莢一分炙去皮子
右十六味擣篩蜜和爲丸空服以飲服如梧子五丸日二服漸漸加至十丸以微利爲度忌桃李雀肉莧菜醋物猪肉陳臭等出第二卷中
深師療上氣搶心胷奄奄不得息服中脹滿食輙吐蘇子湯方
蘇子一升 大棗三十顆 半夏三兩洗 橘皮
生薑 桂心各一兩 蜀椒二分汗
右七味切以水七升煑取二升分三服忌羊肉餳生葱出第十八卷中
古今錄驗半夏湯療上氣五藏閉塞不得飲食胷中脅下支脹乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管脣乾口燥肢體動搖手足疼冷夢寤若見人怖懼此五藏虛乏諸勞氣不足所致并療

婦人方
當歸 防風 黃耆各二兩 柴胡半斤
細辛 麻黃去節 人參各一兩 杏人五十顆去尖皮兩人者
桂心三兩 半夏一升洗 大棗二十枚擘 生薑五兩
黃芩一兩
右十三味切以水一斗先煑麻黃一沸去上沫更入水一升及諸藥煑取五升分爲五服日三夜二忌羊肉生葱生菜餳等出第十九卷中
近効療上氣腹內脹滿飲食不消欲作霍亂及欬嗽紫蘇子丸方
紫蘇子 橘皮各二兩 高良薑 桂心
人參各一兩
右五味擣篩蜜和爲丸每服十五丸酒飲任下若食瓜膾等

物有生熟氣擬似霍亂者即含棗栗許大細細嚥取汁令消盡應時立愈常有此藥永不患霍亂甚神効也忌生葱猪肉陳臭等物

外臺秘要方卷第十

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟　校勘